

Cu un pas înainte

CATALOG TOAMNĂ
KWS 2025



SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



Dragă partener,

Fermierul de astăzi nu mai seamănă cu cel de ieri. Într-o lume în continuă schimbare – cu provocări climatice, reglementări stricte și o piață tot mai competitivă – ai nevoie de mai mult decât semințe bune. Ai nevoie de parteneri de încredere.

La KWS, ne-am pus întrebarea simplă: Cum îți putem fi de folos cu adevărat? Răspunsul l-am găsit ascultându-te. De aceea, îți oferim nu doar semințe cu genetică de top, ci și soluții complete, gândite să transforme fiecare cultură într-un pas sigur spre succes.

Semințele noastre sunt punctul de plecare – puternice, adaptate, pregătite să ofere plante viguroase și randamente maxime. Dar nu ne oprim aici. Cu sprijinul echipei KWS, cu serviciile digitale myKWS, tratamentul INITIO și consultanța noastră personalizată, culturile tale nu doar că vor crește, ci vor prospera.

Știm că fiecare câmp spune o poveste. Vrem să fim parte din ea – nu doar cu produse, ci cu soluții reale, care te ajută să valorifici la maximum potențialul fiecărui hectar.

Ne extindem constant portofoliul, aducând inovație nu doar în cultura de rapiță, ci și în culturile de grâu, orz și secară – pentru ca în orice sezon, indiferent de provocări, să ai la îndemână tot ce e mai bun. Astfel fiind #PartenerulTăuPentruSemințe, îți oferim performanță în fiecare spic.

Și pentru că timpul tău este prețios, am lansat KWS MAIA – chat-ul cu inteligență artificială, disponibil 24/7 pe WhatsApp, cu informații exacte, rapide și mereu la îndemână.

Cu KWS ești mereu Cu un PAS ÎNAINTE – cu semințe de calitate, expertiză agronomică, tehnologie modernă și sprijin real, adaptat nevoilor fiecărei ferme.

Îți mulțumim că ne alegi să facem parte din munca ta. Îți dorim un sezon plin de speranță, de roade bogate și de încredere în viitor!

Echipa KWS Semințe



Cuprins

Cuvânt înainte

- 1** Cuprins
- 2** **TEHNOLOGIA RAPIȚEI DE TOAMNĂ**
10 pași pentru o cultură de nota 10
- 4** **Puricele cruciferelor**
Recomandări de identificare și protecție
- 6** **Genetica KWS - Cu un pas înainte**
- 8** **Conceptul HarvestBOOST**
- 10** **PHOMA PROTECT 2.0 RLMs**
Criterii specifice pentru alegerea hibrizilor de rapiță potriviți
- 14** **INITIO & INITIOINSECT+**
Importanța unui start reușit
- 18** **Să aflăm mai multe despre TuYV**
- 19** **Hibrizii de rapiță KWS**
Alegerea potrivită
- 20** **Criterii specifice în alegerea unui hibrid de rapiță**
- 22** **HARVARD**
- 24** **KWS MIKADOS**
- 26** **KWS SANCHOS**
- 28** **KWS MOOS CL**
- 30** **UMBERTO KWS**
- 32** **KWS GRANOS**
- 34** **KWS SAUROS CL**
- 36** **Soiurile de grâu și orz KWS**
- 40** **Hibrizii de secară KWS**
- 46** **Culturile de acoperire KWS Fit4NEXT**
- 50** **KWS MAIA**
- 52** **myKWS**
Consultanță digitală gratuită pentru fermieri
- 54** **Echipa de vânzări KWS Seminte**
Suntem la doar un apel distanță!

Rapița este una dintre cele mai importante trei culturi de semințe oleaginoase din lume – și, în unele țări din cauza condițiilor pedo-climatice unde nu se pot cultiva alte astfel de culturi, este cea mai importantă cultură pentru semințe oleaginoase.


Datorită recoltei de semințe bogate în ulei, această cultură a căpătat o relevanță tot mai mare din punct de vedere al producției pentru anumite surse de energie: biocombustibili și bioetanol.



TEHNOLOGIA RAPIȚEI DE TOAMNĂ 10 PAȘI pentru o cultură de nota 10

1. Rotația culturilor

Recomandarea noastră este ca revenirea rapiței pe aceeași suprafață să se producă după minimum 4 ani, datorită patogenității unor agenți de dăunare, scăderii populațiilor de buruieni specifice, evitării apariției samulastrei, refacerii agrofondului specific. Rapița este o mare consumatoare de elemente minerale, ea nefiind o planta chimiofilă prin definiție.



2. Managementul solului

Cultura rapiței este foarte pretențioasă la pregătirea terenului și a patului germinativ. Astfel, după recoltarea plantei premergătoare, distrugerea resturilor vegetale este benefică. Fiind o cultură care se seamănă în stratul superficial (2-3 cm), evitați trecerile multiple care conduc la pierderea umidității din sol.

3. Alegerea hibridului

Se face în funcție de specificitățile arealului de cultură, parcelei, tehnologiei de cultivare și de momentul semănatului.

4. Perioada de semănat. Semănatul


Ultimii ani ne-au dovedit că perioada optimă pentru semănatul rapiței de toamnă este destul de largă, în funcție de condițiile climatice înregistrate peste vară. Semănatul în „uscat” a devenit o practică uzuală în rândul fermierilor (luna august), urmând ca după primele precipitații înregistrate, cultura să răsară. Deseori, uniformitatea la răsărire și chiar densitatea calculată nu reprezintă ceea ce ne-am dori. Tratamentul seminței este obligatoriu a avea o componentă fungicidă efectuat în regim industrial pentru o acoperire și un grad de încărcare antifungică uniform repartizată pe masa de semințe.

Adăugarea componentei insecticide aduce siguranța protecției culturii în prima perioadă de vegetație, perioadă cu expunere masivă la dăunători specifici și nespecifici care pot compromite densitatea, arhitectura plantei sau chiar viabilitatea acesteia.




5. Densitatea la semănat

Densitatea la semănat se stabilește conform recomandărilor producătorului. Tratamentul seminței cu insecticide, pregătirea corespunzătoare a terenului și epoca de semănat ne păstrează în limitele acestor recomandări.




6. Erbicidarea

Alegerea erbicidelor se face în funcție de specificul solei privind speciile de buruieni existente, a prezenței samulastrei culturii anterioare, a gradului de mărunțire a terenului (cu aplicare în preemergență sau postemergență) și a toleranței hibrizilor la anumite grupe de erbicide.



7. Aplicarea insecticidelor și controlul dăunătorilor

În funcție de momentele de atac ale dăunătorilor, trebuie planificată aplicarea insecticidelor corespunzătoare acestora, începând de la tratamentul seminței până în fenofazele întârziate.



8. Aplicarea îngrășămintelor specifice și a fertilizanților foliari

Este foarte important ca, toamna, planta de rapiță să aibă la dispoziție o cantitate suficientă de nutrienți în sol, mai ales că 40% din biomasă se formează înainte de intrarea în iarnă, fiind responsabilă de stabilirea viitorului potențial de producție. Fosforul (P) și potasiul (K) se aplică la pregătirea terenului, înainte de semănat (nevoile plantei sunt de 30-40 kg s.a. de P și 40-50 kg s.a. de K per tona de producție estimată). Aplicarea unei cantități ridicate de azot (N) în toamnă poate avea efecte secundare (o creștere vegetativă mai mare, perioadă de vegetație mai extinsă, toleranță scăzută la îngheț). Doza maximă de azot aplicată în toamnă trebuie adaptată la nevoile solului, pentru o evoluție corespunzătoare a plantei de rapiță, fiind, de regulă, cuprinsă între 30-50 kg s.a./ha. Restul cantității care poate ajunge la 150 – 200 kg s.a./ha se aplică etapizat în primăvară, înainte de repornirea în vegetație, respectiv, înainte de înflorire. Aplicarea produselor pe bază de sulf (S) și bor (B), microelemente foarte importante în atingerea unor randamente ridicate de producție.



9. Asigurarea unor condiții optime la iernare

Pentru o dezvoltare optimă a rapiței de toamnă înainte de intrarea în iarnă, trebuie avuți în vedere următorii factori:

- Densitatea de semănat între 35-50 plante/mp, în funcție de recomandările producătorului
- Planta suficient de viguroasă (3x8= 8 frunze, 8mm diametrul coletului, 8cm – lungimea rădăcinii)
- Tija florală să nu depășească 2 cm.
- Utilizarea regulatorilor de creștere și/sau fungicidelor dacă se impune.

10. Tratamentele fitosanitare din a doua parte a vegetației și protecția elementelor de producție

- Multitudinea dăunătorilor prezenți în cultură încă din ferestrele iernii, necesită intervenții repetate cu insecticide de contact.
- Tratamentele cu fungicide sunt recomandate a se aplica la ieșirea din iarnă, dacă pierderile foliajului sunt importante și sunt obligatorii în perioada de înflorire pentru protecția împotriva bolilor precum putregaiul alb sau alternarioza.
- Recoltarea la momentul potrivit, evitând supramaturarea culturii.

■ Dr. ing. TOMEL PETRACHE
Product Management Manager



Puricele cruciferelor

Identificați și acționați corect pentru a vă proteja cultura de rapiță



Identificarea

Puricele cruciferelor este unul dintre cei mai importanți dăunători ai culturilor de rapiță:


- Adultul: 3,2 - 4,6 mm lungime, formă ovală, culoare albastru-negru lucios, uneori cu aripi maro deschis.
- Larva: 7 mm lungime, culoare alb-crem, cu pete întinse pe spate, 3 perechi de picioare, cap maro-închis sau negru și placa abdominală.

Activitatea

- Migrația puricelui către culturile de rapiță începe încă din toamnă.
- Depunerea pontei începe după 12 - 14 zile de hrănire a adulților și continuă pe tot parcursul iernii.
- Depunerea pontei are loc la temperaturi cuprinse între 4 și 16 °C.
- Temperaturile sub 2 °C inhibă depunerea ouălelor, iar temperaturile mai mici de 3 °C inhibă ouatul, dezvoltarea acestora și activitatea larvelor.
- Apariția adulților începând cu luna mai.

Simptomele atacului și daunele provocate

- Adulții se hrănesc cu cotiledoane și frunzele tinere provocând perforații la nivelul cotiledoanelor de rapiță, reducând mult vigoarea plantelor.
- Larvele rod galerii în plantele tinere (toamnă) și distrug meristemele de creștere. Adulții pot distruge tinerele plante de rapiță.



Efectele atacului

- Reducerea vigoriei plantelor
- Risc crescut de deteriorare și de boli cauzate de îngheț
- Reducerea supraviețuirii în timpul iernii
- Crăparea tulpinii în primăvară
- Cel mai rău caz: moartea plantei

MONITORIZAREA

Praguri de dăunare - Adulți

10%

suprafața foliară distrusă de la cotiledon până la stadiul de 3 frunze

Evaluare vizuală

50 de adulți

în 3 săptămâni la stadiul de 4 - 6 frunze

Capcane galbene cu lipici

Praguri de dăunare - Larve

3 larve

pe o plantă slabă

5 larve

pe plante viguroase

- Numărarea larvelor în petioliurile și tulpinile plantelor
- Secționarea plantelor de rapiță
- Metoda pâinii (observație vizuală)



Prevenirea prin lucrările agricole

- Perioadele optime de semănat
- Prelucrarea optimă a solului
- Pregătirea fină a patului germinativ (umiditate adecvată)
- Normele de semănat și densitatea plantelor
- Cultivarea complementară
- Cultivarea de hibrizi toleranți



Managementul rezistenței

- Utilizarea redusă a insecticidelor / evitarea utilizării în exces
- Aplicarea produselor seara pentru a ținti perioada de maximă activitate a puricilor
- Monitorizarea și luarea în considerare a pragurilor de dăunare
- Utilizarea tehnologiei de pulverizare disponibile
- Monitorizarea migrației adulților cu ajutorul capcanelor galbene cu lipici
- Schimbarea substanțelor pentru a evita rezistențele



Controlul chimic

- Tratatamentul semințelor
- Aplicarea de insecticide sintetice

Iulie — Septembrie

August — Martie

August — Decembrie

Hibrizii de rapiță KWS alături de tipul de tratament INITIO și INITIOInsect+ oferă cea mai bună protecție și vă pot conduce către rezultate de producție mai ridicate.



Aflați mai multe:
<https://www.kws.com/ro/ro/produse/rapita/initio/>

SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856






Capcane galbene cu lipici

Monitorizarea specifică a dăunătorilor în cultura de rapiță

Cum se utilizează corect capcanele galbene:

- Standard: 6-8 capcane galbene/teren.
- Amplasarea pe diferite laturi în câmp, la aprox. 10 - 20 m în interiorul culturii - țineți cont de direcția de pătrundere a dăunătorilor din cultura de rapiță.
- Ajustarea înălțimii odată cu creșterea frunzelor - capcanele galbene trebuie să fie la aceeași înălțime cu plantele de rapiță.
- Verificarea capcanelor galbene la intervale de 2 - 3 zile.



Amplasarea în câmp și potențiale căi de intrare în cultură

Puricele cruciferelor
(*Psylliodes chrysocephala*)

Praguri de dăunare:

- 50 de exemplare / capcană galbenă în decurs de 3 săptămâni în stadiul de 4 - 6 frunze
- 10 % din suprafața foliară distrusă din stadiul de cotiledon până la 3 frunze
- 3 larve pe plantele slabe / 5 larve pe plantele viguroase

Gărgărița neagră a tulpinii de varză
(*Ceutorhynchus plicatilis*)

Praguri de dăunare: 10 exemplare / capcană galbenă în 3 zile

Gărgărița verzei
(*Ceutorhynchus pleurostigma*)

Gărgărița pătată a tulpinii de varză
(*Ceutorhynchus pallidactylus*)

Praguri de dăunare: 15 exemplare / capcană galbenă în 3 zile

Gărgărița tulpinilor de rapiță
(*Ceutorhynchus napi*)

Praguri de dăunare: 5 exemplare / capcană galbenă în decurs de 3 zile

Perioada de iernare





Este timpul să facem față provocărilor.

Cu hibrizii de rapiță și serviciile KWS.

Fie că aveți nevoie de expertiză în materie de recoltare pentru a obține producții mai mari, fie că sunteți în căutare de sfaturi cu privire la sănătatea plantelor sau gestionarea insectelor - cu abordarea noastră modulară de semințe și soluții, KWS vă ajută să fiți cu un pas înaintea cu o serie de soluții. Fiecare soluție se bazează pe cei mai buni hibrizi și este personalizată în funcție de nevoile și cerințele dumneavoastră.

Semințe

Genetica reprezintă fundamentul unei culturi de rapiță de succes. Pentru a oferi hibrizi performanți pentru randamente maxime și rotații durabile ale culturilor care să răspundă nevoilor dumneavoastră, este necesar un nivel ridicat de cunoștințe, previziune și muncă.

Genetica KWS

Cercetare: Hibrizii de rapiță de succes nu sunt o coincidență. Ei sunt rezultatul a zeci de ani de experiență și a expertizei deosebite a cercetătorilor KWS. Genetica noastră este rezultatul acestor acțiuni, iar recolta dumneavoastră este succesul.

Soluții

Provocările dumneavoastră. Soluțiile noastre. Pe parcursul unui sezon, în cultura rapiței, există multe etape diferite de dezvoltare, provocări și opțiuni de adaptare care afectează rezultatele finale ale recoltei dumneavoastră. Alegerea hibridului potrivit este primul pas. Dincolo de aceasta, alegerea combinației potrivite de servicii, instrumente și asistență, vă duce recolta la nivelul următor.

KWS HarvestBOOST

Producții pe care vă puteți baza: semințele de înaltă calitate reprezintă baza pentru o recoltă bogată. Dar combinația dintre genetica plantelor, expertiza agronomică, serviciile digitale și tratamentul sămânță INITIO sunt cele care maximizează producțiile dumneavoastră.

KWS PlantPOWER

Înapoi la rădăcini: datorită deceniilor noastre de experiență în biologia plantelor, oferim semințelor noastre tot ce au nevoie pentru a se dezvolta în plante viguroase care pot face față unei game largi de factori de mediu și de risc.

KWS InsectCONTROL

Provocare acceptată: nu lăsați controlul insectelor la voia întâmplării - bazați-vă pe un management eficient al insectelor. Cu InsectCONTROL, puteți reduce semnificativ infestările datorită unui set de instrumente flexibile de măsuri diferite.

Cu un pas înainte.

Cu hibrizii de rapiță și soluțiile KWS.

Mai mult decât atât: **KWS Seminte & Soluții** oferă o combinație de semințe de rapiță de înaltă calitate, cu genetică și soluții suplimentare, cum ar fi asistență agronomică, instrumente digitale și INITIO - Soluția unică de tratament semințe dezvoltată de KWS, care vă pot asigura randamente maxime.

Fiiți #CuUnPasÎnainte

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL**
DIN 1856



HarvestBOOST



■ **HarvestBOOST:** O cultură de rapiță cu un randament de producție ridicat este în continuare obiectivul principal al fermierilor cultivatori de rapiță. Noi, aici la KWS, suntem în măsură să sprijinim fermierii în diferite moduri pentru a atinge cât mai bine acest obiectiv. Urmând conceptul "semințe și soluții", soluția pentru acest obiectiv conține următoarele elemente:

Avem hibrizi de rapiță foarte puternici, cu randament ridicat și rezistenți la boli în portofoliul nostru. Mai multe exemple sunt în continuare: conținut ridicat de ulei sau capacitatea de ramificare ridicată cu rezistență la scuturare. Aceasta din urmă ar permite, de exemplu, ca fermierii să își poată prelungi perioada de recoltare fără riscul de a pierde din producția finală.

Dar nu ne oprim doar la furnizarea hibrizilor de rapiță - oferim servicii suplimentare care pot fi combinate într-un pachet ca soluție pentru fermieri. Ca de exemplu consiliere individuală, instrumente digitale, cum ar fi recomandări de hibrizi, serviciul meteo sau calculatorul normei de semănat plus INITIO - conceptul unic de tratament al semințelor KWS, cu ajutorul acestora fermierii își pot asigura obținerea unui rezultat de producție excelent.

Mai mult decât semințe:

KWS HarvestBOOST este soluția perfectă pentru a duce producția culturii dumneavoastră de rapiță la nivelul următor. Aveți la dispoziție sinergia dintre genetica KWS și soluțiile suplimentare, cum ar fi consultanță agronomică, instrumente digitale performante și INITIO - soluția unică de tratament semințe dezvoltată de KWS, astfel puteți stimula succesul recoltei dumneavoastră.

Fiți #CuUnPasÎnainte.



Hibrizii de rapită KWS HarvestBOOST

**KWS GRANOS
UMBERTO KWS
KWS SANCHOS**

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856**



PHOMA PROTECT 2.0

KWS setează noul standard privind rezistența la *Phoma*



Inovația KWS privind mecanismul de rezistență genetică la *Phoma* în cultura rapiței de toamnă.

Putregaiul negru (*Phoma lingam*), este una dintre principalele boli ale rapiței de toamnă, cauzată de agentul patogen *Leptosphaeria Maculans*. Infecția se produce de regulă în toamnă, când patogenul se manifestă simptomatic pe frunzele tinerelor plante. Evoluția bolii conduce în final la o coacere prematură, urmată de pierderi de producție importante sau chiar la moartea plantei, datorată lipsei alimentării cu apă și elemente nutritive. Boala se transmite prin resturile vegetale rămase pe sol, care conțin spori ai ciupercii. Potențialul de infecție al patogenului este de până la 10 ani.

Phoma este o boală cu apariție frecventă, care poate duce la pierderea culturii în proporție de peste 50% în anii în care presiunea infecției este mare.



Agricultorii trebuie să își evalueze riscul pe care îl prezintă anumiți hibrizi, în baza predispoziției acestora la infecție. Hibrizii cu rezistență genetică la acest patogen oferă o asigurare în plus fermierului pentru obținerea producțiilor scontate. Rezistența specifică determinată monogenic asigură o uniformitate a gradului de protecție în areale și medii foarte diferite de cultivare.

■ Rezistența poligenică sau rezistența de bază.

Are la bază un complex de gene. Fungii atacă planta și duc la apariția unor pete pe frunze, procesele metabolice normale din plantă. Infecția are loc, însă intensitatea necrozelor are un impact mai redus asupra recoltei. Majoritatea hibrizilor de rapiță cultivați astăzi manifestă acest tip de rezistență (*RLM – Resistance Leptosphaeria Maculans 3-7*).

■ Rezistența specifică: Blochează infecția din start și, drept urmare, asigură o protecție totală împotriva patogenului pe care îl controlează. Sporii ciupercii nu pot pătrunde în frunză. Hibrizii cu un astfel de bagaj genetic înregistrează frecvențe și intensități ale atacului patogenului apropiate de **0 (zero)**.

Gena de rezistență specifică, **RLMs** reprezintă cea mai recentă inovație în protecția culturii împotriva *Phoma lingam* și **se regăsește doar în hibrizii KWS**.

Pe tot parcursul testărilor, s-a dovedit că **RLMs oferă protecție maximă** chiar și împotriva acelor tulpini de *Phoma* cu grad de infecțiozitate foarte ridicat.

Cum recunoaștem *Phoma*?

Primele simptome își fac apariția în toamnă. Pe frunze se formează pete necrotice de nuanță gălbui – cenușii, picnidiile ciupercii fiind evidente cu ochiul liber (puncte de culoare închisă). Infecția cauzează moartea parțială a frunzei înainte de intrarea în iarnă, dar, în general, produce un efect nesemnificativ asupra evoluției plantei până în primăvară, când planta își reia activitatea. Sporii supraviețuiesc pe frunzele moarte, dând naștere unei noi infecții în primăvară.

Primăvara, apar mici pete colorate maroniu spre negru la baza tulpinii, care se extind rapid pe suprafața acesteia și spre interior. Aceste necroze se dezvoltă, învaluiie tulpina și o vlăguiesc, conducând la frângerea tulpinii sau la senescenta prematură. Pe silicve apar leziuni brune cu contur negru, determinând maturarea precoce și infecția semințelor, sursă secundară de infecție pentru sezoanele viitoare.



Măsuri de combatere a bolii

Soluția optimă de combatere a acestei boli rămâne cultivarea hibrizilor cu toleranță la *Phoma*, dar care conțin și alte gene de rezistență, așa cum este RLMS, în combinație cu gestionarea corectă a resturilor vegetale din teren, și aceasta întrucât niciun fungicid nu este eficient în totalitate.



Alte practici agricole fac referire la rotația culturilor și controlul samulei. Datorită supraviețuirii agentului patogen în resturile rămase după recoltat, a puterii de contagiune pentru o perioadă lungă de timp, este esențială însămânțarea rapiței de toamnă pe parcele bine prelucrate, aflate într-un asolament rațional, ce respectă principiile unei agriculturi integrate, conforme codului bunelor practici agricole.

Cum abordează KWS acest patogen?

Hibridii de rapiță înglobează diverse mecanisme de protecție împotriva *Phoma*.

KWS a decis să utilizeze ambele tipuri de rezistență, atât monogenică, cât și poligenică.

Rezistența poligenică (complexitatea genetică)

Există mai multe gene responsabile pentru rezistența poligenică, iar mecanismul care o activează este unul complex, care reușește să susțină protecția suficientă împotriva unui spectru larg de tulpini ale *Phoma* (*L. maculans*). Hibridii care dezvoltă rezistență multigenă pot fi afectați de *Phoma*, iar simptomele caracteristice își fac prezența prin atacul specific al frunzelor în toamnă. Chiar dacă simptomele infecției cu *Phoma* sunt evidente, plantele cu rezistență poligenică nu se confruntă cu o pierdere majoră a producției.

Mecanismul poligenic

În funcție de specificul mediului în care planta evoluează, genele responsabile cu sistemul de apărare al acesteia pot reacționa în diverse moduri, ca rezultat al condițiilor diferite și relaționării între factorii de influență (momentul instalării în plantă, presiunea atacului, condițiile climatice, tehnologia aplicată). De aceea, rezultatele înregistrate privind rezistența la agentul patogen sunt discutabile și variază de la caz la caz.

Rezistența specifică (monogenică)

Rezistența specifică este modelul clasic de toleranță la boală, pe care îl caută cultivatorul de rapiță. Genele izolate sunt cele responsabile pentru prevenirea atacului plantei de către *Phoma*. Din acest motiv, plantele cu rezistență monogenică nu prezintă simptome, atât timp cât rezistența nu este „dărâmată” de o tulpină foarte puternică la *Phoma*. Acest tip de rezistență este esențial în stabilirea obiectivelor procesului de ameliorare. Tulpinile de *Phoma* sunt purtătoare de gene specifice, așa-numitele gene virulente, care pot fi „detectate” de către planta care conține în bagajul genetic gena de rezistență. Atunci când patogenul își manifestă contagiunea, planta detectează patogenul și își va activa mecanismul de

apărare, prevenind infecția. Mecanismul de apărare este mult mai simplu, mai direct și mai ușor de previzionat, indiferent de condițiile de mediu, cu rezultate excelente în controlul patogenului.

Rezultatele testelor au dovedit că noua genă RLMS oferă maximum de protecție împotriva Phoma

Sursa noii gene ce conferă o rezistență specifică este napul sălbatic. După inducerea rezistenței la rapiță, această linie genetică a fost utilizată în cadrul programului de ameliorare al KWS, pentru a introduce rezistența la *Phoma* ca și caracteristică de portofoliu. Ameliorarea genetică a început în 2004 și a durat mai mult de 15 ani până când primii hibrizi și-au dovedit performanța și atractivitatea comercială. În această abordare, gena de interes a fost transferată în hibrizii KWS cu caractere agronomice foarte valoroase (potențial productiv, rezistență la scuturarea semințelor din silicve, comportare foarte bună la ger și secetă prelungită, toleranțe ridicate la alte boli specifice).



De-a lungul anilor, KWS a investit
continuu în programele de ameliorare
a hibrizilor de rapiță

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Primul soi
tolerant

Prima rezistență
cantitativă

RLM1



pentru a va oferi hibrizi
rezistenți la boli și dăunători.



2000

2005

2010

2015

2020

RLM7

Sinergia dintre
RLM7 + RLM3

RLMs
KWS setează noul
standard privind
rezistența la *Phoma*



INITIO

IMPORTANȚA UNUI START REUȘIT



INITIO
INSECT+

Convingerea noastră, la KWS, este că „fiecare Sămânță are dreptul să devină Plantă”, de aceea testăm intensiv tratamentele atât în condiții de laborator, cât și în câmp. Astfel, vrem să descoperim combinația optimă ce oferă geneticii noastre protecția de care are nevoie. **INITIO** este o soluție unică de tratare a semințelor, dezvoltată de KWS, care asigură un start rapid și puternic al culturii, precum și protecția împotriva bolilor. Acest sprijin este de o importanță majoră, în special în faza timpurie a plantei.

INITIO și INITIOINSECT+: ce beneficii aduc în cultura de rapiță

INITIO

INITIO este un **sistem unic de tratare** a semințelor dezvoltat de KWS, ce asigură un start rapid și viguros culturii, precum și protecție împotriva bolilor. Această susținere este esențială în primele etape de vegetație ale rapiței. Specialiștii KWS testează intens tratamentele **INITIO**, asigurându-se de calitatea și eficacitatea acestora atât în condiții de laborator, cât și în câmp.

INITIOINSECT+

INITIOINSECT+ conține o **componentă insecticidă**, care protejează tinerele plante în cea mai vulnerabilă etapă. Până în **stadiul de 3 frunze**, atacul dăunătorilor ce se hrănesc cu plantele tinere, este semnificativ redus. Astfel, cultura beneficiază de un start perfect, cu impact pozitiv asupra sănătății plantelor și producției obținute.

Combinația care face diferența

Zn Mn

Zinc și Mangan

- + Îmbunătățesc formarea și stabilitatea peretelui celular = capacitate sporită de apărare contra patogenilor și a stresului timpuriu
- + Sprijină dezvoltarea sistemului radicular



Acidifiant

- + Stimulează creșterea și dezvoltarea rădăcinilor primare și secundare
- + Asigură absorbția mai bună a nutrienților de către rădăcini



Fungicid

- + Protecție împotriva bolilor fungice
- + Asigură dezvoltarea tinerelor plante



Insecticid

- + Spectru larg de combatere a dăunătorilor
- + Impact pozitiv asupra sănătății plantelor și a producției obținute

INITIO



INSECT

Efectele testelor realizate	INITIO	INITIOINSECT+
 Dezvoltarea mai bună a rădăcinilor	✓	✓
 Toleranță la stresul din primele faze de vegetație	✓	✓
 Dezvoltarea optimă a tinerelor plante	✓	✓
 Fungicid	✓	✓
 Insecticid	✗	✓

Efectele INITIO. Pe scurt.

În urma numeroaselor teste realizate, după primele 14 zile de la răsărire, plantele tratate cu **INITIO** au o **suprafață a rădăcinii cu 70% mai mare** comparativ cu plantele la care s-au utilizat tratamente standard.

Un sistem radicular bine dezvoltat are puterea de a afâna solul, chiar și în straturile mai adânci, cu efect de creștere a producției la culturile postmergătoare rapiței (de ex., la grâu: producție mai mare cu până la 0,5-1 t/ha).

Cu un pas înainte.

Cu hibrizii de rapiță **KWS InsectCONTROL**.



Mai mult decât semințe: **KWS InsectCONTROL** reprezintă soluția potrivită pentru o mai bună gestionare și combatere a dăunătorilor din primele stadii de vegetație. Prin sinergia dintre genetica performantă KWS și a unor soluții suplimentare, cum ar fi consilierea agronomică și INITIO - Soluția inovatoare de tratament semințe KWS, puteți să beneficiați de control mai bun împotriva anumitor dăunători din câmp.

Fiți #CuUnPasÎnainte

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856**



Impulsul pentru O creștere puternică

**INITIO – Soluție inovatoare de tratament
sămânță de la KWS**

Protejați-vă culturile de rapiță cu INITIO

INITIO este soluția avansată dezvoltată de KWS pentru tratamentul semințelor. Aceasta este formată din diverse componente, aplicate seminței, având rolul de protecție și de stimulare a proceselor postgerminative. Fiecare dintre aceste componente oferă anumite beneficii pentru fermieri și împreună fac diferența, astfel este pus în valoare adevăratul potențial al geneticii KWS!

#kwsinitio

www.kws.com



SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



SĂ AFLĂM MAI MULTE DESPRE TuYV

(Virusul galben al ridichii)



- Restricționarea utilizării neonicotinoidelor reclamă o atenție sporită asupra culturii rapiței de toamnă, încă de la răsărire. Pachetul fitosanitar cu care sămânța este înzestrată genetic, nu asigură din păcate rezistențe sau toleranțe la atacul dăunătorilor, de altfel foarte numeroși (purecii cruciferelor, molia cruciferelor, viespea rapiței, musca rădăcinilor sau afidele ș.a.).
- Aceștia dezvoltă o acțiune foarte agresivă asupra plantei chiar până la dispariția plantelor tinere – determinând pierderi mari în densitate sau în arhitectura viitoarei plante, deseori debilitată. Pe de altă parte, în plan secundar, aceștia pot fi principalii vectori pentru virozele instalate încă din toamnă. Unul dintre agenții patogeni prezenți în ultimii ani și în România, este virusul galben al ridichii (TuYV), care are ca vector de transmitere o specie polifagă de afide – *Myzus persicae*.
- Din punct de vedere taxonomic, TuYV aparține familiei Luteoviridae, genul Palerovirus, care a dat naștere unei multitudini de agenți patogeni, cunoscuți în foarte multe culturi.
- În cultura de rapiță, virusul se manifestă încă din stadiile incipiente de dezvoltare, prin cianozarea marginilor frunzelor. Acțiunea virusului asupra frunzelor plantei continuă în primăvară, colorându-le într-o nuanță violacee.
- Efectele avansării infecției în plantă sunt evidențiate de pierderea masei foliare, urmată de încetinirea procesului de fotosinteză, respectiv reducerea în lungime a ramificațiilor, a silicvelor și, ca urmare, a numărului de semințe pe plantă. Așadar, este afectată atât producția, cât și indicii calitativi, mai exact, ne vom confrunta cu un conținut mult redus de ulei și cu un procent mărit de glucosinolați.
- În multe cazuri, infecția cu virusul TuYV poate fi lejer confundată cu o carență sau pseudocarență de fosfor, cu diferența că, în cazul acestor carențe, frunza va avea o culoare vinețiu – roșcată răspândită pe toată suprafața acesteia și nu doar marginal.

Cum putem lupta împotriva infecției cu virusul TuYV?

Cel mai adesea, fermierii ridică întrebări asupra pierderilor de producție ce survin după identificarea acestora în cultură, care sunt principalele metode de combatere și, bineînțeles, ce costuri implică intervențiile. Cercetări în domeniu, relevă faptul că pierderile de producție pot atinge 30%.

Condițiile climatice a ultimilor ani sunt extrem de imprecizabile în privința precipitațiilor căzute, a distribuției acestora peste an, dar ceea ce este evident face referire la temperaturile tot mai ridicate, instalate foarte devreme (luna mai) și extinse până toamna târziu (noiembrie - decembrie). Astfel fermierii trebuie să își adapteze tehnologia la principiul controlului integrat, care îmbină utilizarea hibridilor cu toleranță ridicată (protecție genetică), în cadrul practicilor agricole și lucrărilor agrotehnice, cu folosirea metodelor chimice și biologice de combatere a dăunătorilor, astfel încât să se asigure că au optimizat potențialul productiv al hibridilor și că pot obține astfel profitul scontat.

E bine de știut că însămânțările timpurii măresc șansa de infecție prin prezența pe o perioadă mai îndelungată a afidelor în cultură. Așadar intervențiile cu insecticide în perioada de toamnă trebuie efectuate ori de câte ori este nevoie.



Care sunt rezultatele cercetării KWS asupra acțiunii virusului TuYV?

Când pregătim câmpurile de testare și loturile de hibridare, luăm în considerare apariția virusului și posibilitatea apariției infecției. Sub presiunea infecției într-un stadiu avansat, comparăm rezultatele hibridilor noștri cu ale celor rezistenți la acțiunea virusului, și, de cele mai multe ori, observăm performanța sporită a hibridilor toleranți la virus.

Trebuie să menționăm că în natură apar permanent foarte multe cauze care pot influența o cultură. De aceea, cel mai important obiectiv al activității noastre de ameliorare rămâne crearea de hibridi stabili și cu potențial ridicat de producție, chiar și în condiții dificile. Ne concentrăm, bineînțeles, în programele de ameliorare, și pe genele care asigură rezistență la diverși agenți patogeni, dar vom continua să lansăm hibridi toleranți la aceștia doar în măsura în care suntem 100% convinși, în primul rând, de un beneficiu semnificativ pentru producție.



Hibridii noștri prezintă toleranță superioară la virusul TuYV datorită geneticii avansate KWS. Hibridii cu toleranță la TuYV obțin rezultate de producție foarte bune chiar și sub atacul agenților de dăunare.

Este bine ca fermierii să știe faptul că atât toleranța, cât și rezistența parțială, sunt dezvoltate doar împotriva acțiunii virusului, nu și a afidelor care îl poartă și transmit. Transmiterea virusului este doar o rezultată a acțiunii afidelor. Afidele pot cauza daune majore plantei, mai ales atunci când sunt create condițiile favorabile pentru înmulțirea acestora (toamnă mai caldă, secetă severă). Acesta este un efect care nu are legătură cu apariția virusului și demonstrează de ce este necesar controlul permanent al afidelor, pentru evitarea pierderilor de producție. Atât avantajul toleranței la virus, cât și al rezistenței parțiale este că, atunci când nu este posibilă combaterea chimică a afidelor datorită condițiilor meteo, infecția cu virusul TuYV nu va avea consecințe negative asupra culturii.



Hibrizi
stabili



Semințe de
cinci stele



Simplu, cea mai
potrivită alegere!



Caracteristici
agronomice
superioare



SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



Criterii specifice în alegerea unui hibrid de rapiță



Vigoare foarte bună la răsărire

Efect foarte bun, mai ales în condiții dificile (perioadă lungă fără precipitații sau semănat întârziat).



Creștere rapidă în toamnă

Plantele se dezvoltă compact și uniform, astfel se pregătesc foarte bine pentru intrarea în iarnă.



Iernarea

Plantele se dezvoltă uniform în toamnă și au o foarte bună toleranță la temperaturile scăzute. Acest lucru permite hibrizilor de rapiță KWS să beneficieze de o toleranță superioară la iernare.



Rezistența la boli

În primul rând rezistența la Putregaiul negru (Phoma lingam), datorită prezenței genelor specifice RLMS responsabile de această trăsătură. Gena de rezistență specifică, RLMS reprezintă cea mai recentă inovație în protecția culturii împotriva Phoma lingam și se regăsește doar la hibrizii KWS.



Randament ridicat și stabilitate a producției

Rezistența deja dovedită la scuturarea boabelor din silicve înainte de recoltat asigură un plus de producție semnificativ mai mare dar și o fereastră largă de timp pentru recoltare. Acestea, precum și caracteristicile menționate anterior, influențează obținerea unor randamente ridicate și stabile.





Producții de top!



HARVARD

- Rezistență genetică la *Phoma lingam* asigurată de către *Phoma protect 2.0 RLMs* (RLM7 și RLM3).
- Potențial de producție foarte ridicat.
- Toleranță foarte bună la *Verticillium longisporium*.

www.kws.ro

SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



KWS MIKADOS



Unul dintre hibrizii de **NOUĂ GENERAȚIE** în care sunt integrate cele mai moderne și inovative însușiri genetice, care să asigure o plasticitate largă și randamente ridicate.

- Toleranța la cancerul tulpinilor, este asigurată de cea mai nouă și inovatoare protecție împotriva *Phoma lingam* → **RLMs** (*Resistance to Laeptosheria Maculans* – agentul patogen ce cauzează boala)
- Toleranță foarte bună la *Verticillium longisporium* (simptomatologie asemănătoare Sclerotiniei, cu formare de scleroți; pagubele pot atinge 50%)
- Toleranță foarte bună la *Pyrenopeziza brassicae*, responsabilă de pătarea frunzelor
- Areal de cultivare: toate zonele pretabile culturii de rapiță (**nu se recomandă pentru semănatul întârziat**)

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridică
Înflorire	timpurie		târzie
Conținutul în ulei	scăzut		ridicat



PARTICULARITĂȚILE HIBRIDULUI:

- Conținutul în ulei: peste medie (45% - 47%).
- Vigoarea în toamnă: medie.
- Tulpina viguroasă asigură o excelentă comportare la căderea lanurilor / frângerea tulpinii, cauzate de patogeni sau rafale puternice de vânt.
- Densitatea la semănat: 40 – 50 b.g./mp.



BENEFICIILE FERMIERULUI:

- Repornirea în vegetație primăvara: mediu-târzie, dar accelerată → **ROBUSTEȚE & PRODUCTIVITATE.**
- Rezultate de producție excepționale în condiții de mediu diferite de climă și tehnologie din întreaga **Europă** → **ADAPTABILITATE & STABILITATE.**



Producții de top!



KWS MIKADOS

- Rezistență genetică la *Phoma lingam* asigurată de către *Phoma protect 2.0 RLMs* (RLM7 și RLM3).
- Plasticitate largă și potențial de producție ridicat.
- Toleranță foarte bună la *Pyrenopeziza brassicae*, responsabilă de pătarea frunzelor.

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL**
DIN 1856



KWS SANCHOS



Hibrid de **NOUĂ GENERAȚIE** din grupa semi-timpurie de maturitate cu însușiri genetice moderne.

- Potențial de producție foarte ridicat, dublat de cea mai bună notă privind comportarea la scuturare pe perioada mai multor ani de testare (recomandat ca succesor al hibridului Hillico)
- Toleranța la cancerul tulpinilor, este asigurată de cea mai nouă și inovatoare protecție împotriva *Phoma lingam* → **RLM 7** (*Resistance to Laeptosoheria Maculans – agentul patogen ce cauzează boala*)
- Areal de cultivare: toate zonele pretabile culturii de rapiță cu rezultate de excepție în zonele supuse frecvent secetei

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridică
Înflorire	timpurie		târzie
Conținutul în ulei	scăzut		ridicat



PARTICULARITĂȚILE HIBRIDULUI:

- Hibrid semi-timpuriu.
- Conținutul în ulei: peste medie (45% - 47%).
- Densitatea la semănat: 50 – 55 b.g./mp.
- Planta are o structură robustă cu un profil fitosanitar de excepție.



BENEFICIILE FERMIERULUI:

- Are o viteză excepțională de umplere a boabelor, și un MMB ridicat, care îi asigură un avantaj în atingerea performanțelor de producție.
- Înflorirea târzie reduce riscul provocat de înghețurile ce pot surveni după reluarea vegetației în primăvară.



Expertul în secetă!



KWS SANCHOS

- Viteză excepțională de umplere a boabelor, MMB ridicat.
- Protecție la *Phoma lingam* asigurată de către RLM7.
- Rezistență superioară la scuturarea semințelor din silicve.

www.kws.ro

SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



KWS MOOS CL



Clearfield®

Sistem de producție pentru rapiță

Hibrid de **NOUĂ GENERAȚIE** din grupa semi-timpurie de maturitate ce poate fi cultivat în tehnologia Clearfield (pentru solele cu infestare de *Sinapis alba*)

- Potențial de producție ridicat
- Grupa de maturitate și vigoarea foarte bună din prima perioadă de vegetație, îl recomandă și pentru semănatul întârziat
- Prima ramificație se desprinde încă de la baza tulpinii, asigurând astfel un număr suficient de mare pentru o masă bogată de silicve
- Areal de cultivare: toate zonele pretabile culturii de rapiță

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridică
Înflorire	timpurie		târzie
Conținutul în ulei	scăzut		ridicat



PARTICULARITĂȚILE HIBRIDULUI:

- Hibrid semi-timpuriu.
- Talia plantei: medie.
- Conținutul în ulei: peste medie (42% - 45%).
- Densitatea la semănat: 50 – 55 b.g./mp.



BENEFICIILE FERMIERULUI:

- Comportare excepțională la scuturarea semințelor din silicve.
- Comportare foarte bună la căderea lanurilor datorate rafalelor de vânt din perioada de vară.
- Înflorirea târzie, reduce riscul provocat de înghețurile ce pot surveni după reluarea vegetației în primăvară.



Nu tăia elanul culturii tale!



KWS MOOS CL

- Pretabil și pentru semănatul întârziat.
- Capacitate de producție ridicată.
- Toleranță ridicată la boli (*Phoma* și *Sclerotinia*).

www.kws.ro

SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



UMBERTO KWS



- Hibrid consacrat pentru productivitate foarte ridicată
- Dovedește o comportare exemplară la condiții climatice dificile (ger, secetă)
- Rezistență superioară la scuturare

Umberto KWS este un hibrid intensiv, cu cele mai bune recomandări de a deveni "coloana vertebrală" a culturii de rapiță în fermele care urmăresc cele mai înalte niveluri de producție. Plasticitatea ecologică de anvergură îi conferă o adaptabilitate la cele mai diverse areale de cultură, chiar și în cele predispuse la perioade de secetă intensă.

Toleranța ridicată la iernare este notată ca fiind cea mai bună din multitudinea de hibrizi comercializați în România. Comportarea foarte bună la scuturarea semințelor din silicve, una dintre principalele particularități ale hibrizilor KWS, garantează obținerea celor mai bune rezultate în fermă.

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridică
Înflorire	timpurie		târzie
Viteza de creștere în toamnă	scăzut		ridicat
Repornirea în vegetație	lentă		rapidă
Talia	mică		mare



PARTICULARITĂȚILE HIBRIDULUI:

- Hibrid semi-tardiv.
- Talie mediu-înaltă.
- Vigoare foarte bună la răsărire urmată de o viteză de creștere remarcabilă până la intrarea în iarnă.
- Rezistență poligenică aproape totală la putregaiul negru – *Phoma lingam*, asigurat de gena RLM7-3.
- Capacitate extraordinară de mare de ramificare a tulpinii.
- Număr ridicat de semințe/silicvă.
- Conținut ridicat în ulei: 44-47%, cu un conținut scăzut în glucozinolați.



BENEFICIILE FERMIERULUI:

- **Umberto KWS** a demonstrat deja că atinge cu ușurință nivelul așteptărilor cultivatorilor de rapiță, utilizând în mod eficient toate resursele nutriționale aflate la dispoziție.
- Nivelul ridicat și stabilitatea producției oferă siguranță fermierului în decizia de pre-contractare a recoltei.
- Hibrid melifer foarte apreciat de apicultori.



Cel mai vândut hibrid de
rapiță din România.
În continuare regele.



UMBERTO KWS

- Rezistență genetică la *Phoma protect 2.0* (RLM7 și RLM3)
- Dezvoltare rapidă în primăvară și toamnă
- Toleranță ridicată la boli (*Phoma* și *Sclerotinia*)

www.kws.ro

SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



KWS GRANOS



- Rusticitatea (robustețea plantei) este dublată de adaptabilitatea și eficiența superioară a asimilării elementelor nutritive (în special a azotului).
- Elementele de producție bine definite (ramificații numeroase, număr mare de silicve bogate în semințe cu MMB mare).
- Rezistență genetică la *TuYV* (virusul galben al ridichei) și toleranță genetică superioară la *Phoma lingam*.

KWS Granos se evidențiază prin: timpurietate, adaptabilitate, rezistență la scuturare și productivitate.

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridică
Înflorire	timpurie		târzie
Viteza de creștere în toamnă	lentă		rapidă
Repornirea în vegetație	lentă		rapidă
Talia	mică		mare



PARTICULARITĂȚILE HIBRIDULUI:

- Hibrid semi-timpuriu.
- Talie mediu-înaltă.
- Vigoare foarte bună la răsărire urmată de o viteză de creștere remarcabilă până la intrarea în iarnă.
- Rezistență poligenică aproape totală la putregaiul negru – *Phoma lingam*, asigurat de gena RLM7-3.
- Capacitate extraordinar de mare de ramificare a tulpinii.
- Număr ridicat de semințe/silicvă.
- Conținut ridicat în ulei: 47-49%, cu un conținut scăzut în glucozinolați.



BENEFICIILE FERMIERULUI:

- Este un hibrid din grupa semi-timpurie de maturitate, cu o viteză de creștere rapidă în prima perioadă de vegetație (toamna) ceea ce îl recomandă și pentru semănatul întârziat.
- Timpurietatea la înflorire determină formarea elementelor de producție (nr. silicve/plantă și nr. semințe/silicvă) înaintea instalării stresului cauzat de arșiță și secetă.
- Coacerea uniformă a silicvelor și rezistența foarte bună la scuturare constituie un real avantaj pentru fermieri în vederea planificării momentului de recoltare.

Protecție și inovație.

KWS GRANOS

- Rezistență genetică la virusul TuYV
- Rezistență genetică la *Phoma lingam* (RLM 7)
- Capacitate superioară de asimilare a azotului disponibil
- Coacere uniformă și rezistență la scuturare.

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL**
DIN 1856



KWS SAUROS CL



Clearfield®

Sistem de producție pentru rapită



**PHOMA
PROTECT 2.0**

- Hibrid cu rezistență la imazamox, recomandat în tehnologia *Clearfield*® (în special în solele infestate de *Sinapis alba*).
- Buna toleranță la gerurile de peste iarna, face ca hibridul să poată fi cultivat și în arealele frecvent supuse acestui risc.
- Reporneste mai târziu în vegetație după perioada de iarnă, ceea ce îi conferă o comportare excelentă la înghețurile târzii ce pot afecta drastic elementele de producție.
- Înălțimea medie – înaltă a plantei și o ramificare abundentă chiar de la baza tulpinii, asigură arhitectural planta la căderea lanurilor.
- Rezistență genetică la *Phoma* asigurată de gena RLM7.
- Productivitatea este extrem de ridicată, întărită de buna comportare la scuturarea semintelor din silicve.

Recomadări de cultivare:
în toate arealele de cultură a rapitei de toamnă

CARATTERISTICI AGRONOMICHE

Grupa de maturitate	timpurie		tardivă
Potențial de producție	scăzut		ridicat
Comportarea la scuturare	scăzută		ridicată
Înflorire	timpurie		târzie
Viteza de creștere în toamnă	lentă		rapidă
Repornirea în vegetație	lentă		rapidă
Talia	mică		mare

 **PARTICULARITĂȚILE
HIBRIDULUI:**

- Hibrid semi-tardiv.
- Talie mediu-înaltă.
- Număr ridicat de semințe/silicvă.
- Rezistența genetică la putregaiul negru *Phoma lingam*, oferită de gena RLM7.

BENEFICIILE FERMIERULUI:

- Hibrid versatil – pretabil atât în tehnologia Clearfield®, cât și în cea convențională.
- Tehnologia Clearfield® ajută fermierul în combaterea buruienilor crucifere (sinapis alba, muștarul sălbatic) din cultura rapiței de toamnă.
- Hibrid adaptabil în condiții climatice extreme, optim pentru cultivare în centrul țării, dar și în nordul țării.
- Asigură o fereastră largă de timp pentru recoltare.



+ de Forță



KWS SAUROS CL

- Hibrid versatil (pretabil atât pentru tehnologia Clearfiled®, cât și pentru cea convențională)
- Rezistență la condiții climatice dificile (îngheț, secetă)
- Productivitate superioară (rezistență la scuturare și MMB ridicat)

www.kws.ro

**SEMĂNĂM
VIITORUL**
DIN 1856



Cultura cerealelor păioase în România între tradiție și inovație. Performanță în fiecare spic.

Cultura grâului este deseori considerată ca fiind cea mai importantă cultură agricolă din România, pe de-o parte datorită tradiției în cultivare, iar pe de altă parte, datorită poziționării acesteia în asolamentul oricărei ferme. Întâlnind condiții propice de cultivare în toate arealele agricole din țară, astăzi ocupă cea mai mare pondere printre culturi.

Grâul reprezintă una dintre cele mai importante monede de schimb dintotdeauna, iar România recunoscută cândva ca și *grânarul Europei* joacă un rol determinant în bazinul Marii Negre în asigurarea siguranței și securității alimentare. Prin prisma destinației producției (panificație) grâul își păstrează constanța suprafețelor cultivate, chiar dacă fluctuația prețurilor este una foarte dinamică.

Portofoliul de cereale păioase al companiei KWS este unul foarte vast, anual testând zeci de varietăți în vederea selecției celor mai adaptate soiuri la condițiile pedoclimatice foarte dinamice, dar și a cerințelor legate de nivelul indicilor de calitate superiori pentru o piață matură.

Desigur, inovația KWS în această cultură este permanentă, poziționându-ne într-una dintre companiile de top în ceea ce privește performanța soiurilor noastre sub aspectul productivității, dar și a însușirilor de rezistență/toleranță la diversitatea agenților de dăunare.

KWS Extreme, KWS Sphere, KWS Ultim sunt soiuri care în numai câțiva ani de la lansare sunt cultivate pe areale importante, dar trebuie amintit că varietăți noi precum **KWS Episode, KWS Felice**, completează din acest an portofoliul nostru, astfel încât să acoperim toate segmentele de maturitate și niveluri tehnologice.

De asemenea în ultimii ani și soiul de orz **KWS Borrelly**, reprezintă alegerea a tot mai multor fermieri pentru cultivare. Este un soi de **orz** foarte productiv, ușor adaptabil, cu caracteristici genetice pregătite pentru a face față provocărilor actuale.

KWS EXTREME



SOI DE GRÂU TIMPURIU, ARISTAT



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Înălțimea plantei: medie.
- Potențial de producție ridicat, cu un număr bogat de boabe în spic.
- Toleranță bună la secetă, recomandat și pentru zonele aride.
- Timpurietatea constituie deseori un avantaj determinat în atingerea unor niveluri de producție superioare, evitând temperaturile ridicate survenite la momentul umplerii boabelor.
- Se pretează și pentru însămânțările întârziate.
- Nu prezintă riscuri de încolțire a seminței în spic.
- Toleranță foarte bună la înghețurile de peste iarnă.
- Norma de semănat: 200 - 220 kg/ha (400 – 500 b.g/mp).
- Recomandări de cultivare: pretabil în toate zonele de cultură din România.



KWS SPHERE



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Înălțimea plantei: medie – înaltă.
- Soi modern, ușor adaptabil la condiții variate de cultură și tehnologie, cu un potențial de producție foarte ridicat.
- Profil fitosanitar foarte bun (rezistență la mozaicul dungat și toleranță ridicată la septorioză, fuzarioză, îngenunchere).
- Tulpina viguroasă și elastică îi asigură o comportare excelentă la căderea lanurilor.
- Bună toleranță la iernare; toleranță ridicată la înghețurile târzii.
- Indici de panificație superiori cu masă hectolitrică foarte bună.
- Norma de semănat: 200 – 220 kg/ha (400 – 500 b.g/mp).
- Recomandări de cultivare: pretabil în toate zonele de cultură din România.



KWS ULTIM

SOI DE GRÂU SEMI-TIMPURIU, ARISTAT



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Înălțimea plantei: medie, cu o capacitate extraordinară de înfrățire.
- Soiul prezintă rezistență la virusul mozaicului dungat al îngălbenirii grâului, la pătarea în ochi a bazei tulpinii (*Pseudocercospora herpotrichoides*), și la tănțarușul semințelor de grâu - *Sitodiplosis mosellana* (OWBM).
- Soi pretabil în tehnologii intensive cu scheme tehnologice complexe de protecție a culturii.
- Bună toleranță la iernare.
- Capacitate de panificație bună.
- Foarte bună comportare la căderea lanurilor.
- Norma de semănat: 200 - 220 kg/ha (400 - 500 b.g/mp).
- Recomandări de cultivare: pretabil în toate zonele de cultură din România.



KWS EPISODE

SOI DE GRÂU SEMI-TIMPURIU, ARISTAT



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Înălțimea plantei: medie.
- Pachet fitosanitar excelent cu toleranțe ridicate la principalele boli ale grâului (în experiențe s-a diferențiat cu cele mai bune note privind toleranța la *Septoria tritici* și rugina brună - *Puccinia recondita*).
- Capacitate bună de înfrățire.
- Suportă foarte bine temperaturile scăzute de peste iarnă.
- Masa hectolitică depășește frecvent 78%.
- Norma de sămânță la semănat: 200 - 220 kg/ha (400 - 500 b.g/mp).
- Recomandări de cultivare: pretabil în toate zonele de cultură din România.



KWS FELICE

SOI DE GRÂU SEMI-TIMPURIU, ARISTAT



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Înălțimea plantei: medie
- Pachet fitosanitar excelent cu toleranțe ridicate la principalele boli (în experiențe s-a diferențiat cu cele mai bune note privind toleranța la rugina galbenă - *Puccinia striiformis*).
- Indicii de calitate îl poziționează într-o clasă superioară de panificație.
- Procentul de proteină este foarte ridicat, depășind frecvent 14%.
- Norma de sămânță la semănat: 200 - 220 kg/ha (450 - 550 b.g/mp).
- Recomandări de cultivare: pretabil în toate zonele de cultură din România.



KWS BORRELLY

SOI TIMPURIU DE ORZ, DE TOAMNĂ PE 6 RÂNDURI



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Combinația ideală între precocitate, productivitate și rezistențe genetice la principalele viroze.
- Maturitatea timpurie conferă avantajul umplerii rapide a boabelor până la instalarea arșiței de la începutul verii.
- Rezistență genetică la virusul mosaicului orzului (Y1) și toleranță extrem de ridicată la virusul galben al piticirii orzului, boli cu o frecvență și intensitate a atacului ridicate în ultimii ani datorită presiunii de atac a afidelor în perioadele calde și lungi de toamnă.
- Toleranță ridicată la principalele boli ale orzului (*Ustilago nigra*, *Blumeria graminis*, *Pyrenophora graminea*, *Pyrenophora teres*, *Rhinchosporium secalis*, *Ramularia*).
- Comportare excelentă la gerurile de peste iarnă.
- Talia medie și elasticitatea tulpinii îi conferă o comportare bună la căderea lanurilor înainte de recoltare.
- Fiind prima cultură recoltată, orzul aduce primii bani în fermă



Secara este o importantă plantă de cultură, originară din Asia de Sud-Vest, Asia Mică și Caucaz, ce s-a răspândit în Europa împreună cu sămânța de grâu. Secara este utilizată, în principal, în alimentația omului, fiind a doua cereală utilizată în panificație, după grâu. Secara se poate cultiva în condiții vitrege pentru grâu, în zonele cu climă rece și umedă sau în zone secetoase, valorificând în același timp și solurile nisipoase sau acide. Boabele se pot utiliza ca materie primă în industria amidonului, glucozei, alcoolului. Totodată, secara este utilizată ca plantă de nutreț sau ca borceag de toamnă, iar paiele se pot folosi ca furaj grosier, la împletituri, în industria celulozei și a hârtiei etc. Secara nu este pretențioasă față de planta premergătoare. În funcție de zona de cultură și de sol, ca bune plante premergătoare întâlnim: cerealele, leguminoasele, rapița, floarea-soarelui, porumbul timpuriu.

Compania KWS este cel mai mare producător de secară hibridă, cu întrebuințări multiple (ca siloz sau materie primă AD/etanol), producție de cereale (pentru cereale furajere, făină, distilare) cu un program de ameliorare și producție pe termen lung, stabilit la mijlocul anilor 1980.

Astăzi, în România, dispunem de 4 hibrizi de secară în portofoliul nostru:

■ 3 hibrizi multi-uz energetic/biomasă sau boabe: panificație, distilare, furajare **KWS**

Serafino, KWS Tayo și cel mai nou hibrid lansat, **KWS Emphor**, precum și

■ cel mai bine vândut hibrid de secară pentru furaje însilozare și pășunat, **KWS Progas**.



KWS PROGAS




HIBRID DE SECARĂ NR.1 PENTRU SILOZ ȘI CALITATE! POLLENPLUS®



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- KWS Progas este un hibrid excelent de furaje pentru însilozare și pășunat.
- Oferă o calitate superioară a furajelor și este optimă pentru tăierea timpurie și sistemele de recoltare dublă.
- Dezvoltă un sistem radicular foarte mare care ajută la îmbunătățirea absorbției de nutrienți și apă și la reducerea necesarului de aport cu 20% la același nivel de producție ca și alte cereale de iarnă.
- Se poate cultiva pe orice tip de sol.
- Randament furajer foarte mare.
- Toleranță ridicată la boli și stres termo-hidric (și pe timpul iernii).
- Secara are un conținut mai mare de fibre și fructan decât alte tipuri de cereale, oferind mai multă sațietate porcinelor.
- Este o opțiune foarte bună pentru furajare în zootehnie: îngrășare bovine, porcine, însilozare etc.



KWS PROGAS

Tip varietate:	Hibrid 100% F1
Uz/produs final	- boabe (furajare) - uz energetic/biomasă

RECOMANDĂRI:

Norma semănat, b.g./m2	- Sept. – 200 - 220 b.g./m2 - Oct. - 250 b.g./m2
Adâncime semănat:	2 - 3 cm
1U, Unitate sămânță:	- 1 mln.boabe/sac sau 25 mln. boabe sac/BB*



CARACTERISTICI:

- Însilozare la maturitate: - 30-40% SU*
- Umiditate la recoltare, boabe: - 13-15 %
- Producții boabe: - peste 10 to/ha
- Conținut proteine, % - 8-11%
- Rezistență frângere/cădere: - bună
- Înălțime plante: - 128 - 136 cm
- Rezistență rugina brună/făinare/ergot: - foarte bună

* BB - big bag

* SU - substanță uscată


KWS SERAFINO

HIBRID DE SECARĂ POLLENPLUS®



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Panificație, zootehnie, uz energetic/biogaze și bioethanol.
- Producții înalte de boabe la ha: N1 index de recoltare (boabe/spic).
- Toleranță ridicată la boli și stres termo-hidric.
- Oferă cel mai înalt index de recoltare cu cele mai bune calități de panificație.
- Este o opțiune foarte bună pentru furajare în zootehnie: îngrășare porcine, bovine, însilozare etc.
- Producție excelentă boabe & biomasă la costuri minime de cultivare.
- Se poate folosi în industria alimentară: panificație, cereale mic dejun, pentru distilare sau malț.



KWS SERAFINO

Tip varietate:	Hibrid 100% F1
Uz/produs final	- boabe (panificație, furajare) - uz energetic/biomasă

RECOMANDĂRI:

Norma semănat, b.g./m2	- Sept. – 200 - 220 b.g./m2 - Oct. - 250 b.g./m2
Adâncime semănat:	2 - 3 cm
1U, Unitate sămânță:	- 1 mln.boabe/sac sau 25 mln. boabe sac/BB*



CARACTERISTICI:

- Însilozare la maturitate: - 30-40% SU*
- Umiditate la recoltare, boabe: - 13-15 %
- Producții boabe: - peste 10 to/ha
- Conținut proteine, % - 8-11%
- Rezistență frângere/cădere: - foarte bună
- Înălțime plante: - 128 - 136 cm
- Rezistență rugina brună/făinare/ergot: - foarte bună

* BB - big bag

* SU - substanță uscată



HIBRID DE SECARĂ POLLENPLUS®



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- Hibrid din noua generație de hibrizi **PolenPlus** cu o excelentă tulpină puternică.
- Hibrid multi-uz: energetic/biomasă sau boabe: panificație, distilare, furajare.
- N1 index de recoltare (boabe/spic) pentru producții mari de boabe.
- Secara are un conținut mai mare de fibre și fructan decât alte tipuri de cereale, oferind mai multă sațietate porcinelor.
- Opțiune foarte bună pentru furajare în zootehnie: îngrășare porcine, bovine, însilozare etc.
- Producție excelentă boabe & biomasă la costuri minime de cultivare.
- Utilizare multiplă: în industria alimentară: panificație, cereale mic dejun, pentru distilare sau malt.



KWS TAYO

Tip varietate:	Hibrid 100% F1
Uz/produs final	- boabe (panificație, furajare) - uz energetic/biomasă

RECOMANDĂRI:

Norma semănat, b.g./m2	- Sept. – 200 - 220 b.g./m2 - Oct. - 250 b.g./m2
Adâncime semănat:	2 - 3 cm
1U, Unitate sămânță:	- 1 mln.boabe/sac sau 25 mln. boabe sac/BB*



CARACTERISTICI:

- Însilozare la maturitate: - 30-40% SU*
- Umiditate la recoltare, boabe: - 13-15 %
- Producții boabe: - peste 10 to/ha
- Conținut proteine, % - 8-10%
- Rezistență frângere/cădere: - foarte bună
- Înălțime plante: - 110 - 132 cm
- Rezistență rugina brună/făinare/ergot: - foarte bună

* BB - big bag

* SU - substanță uscată

KWS EMPHOR



HIBRID DE SECARĂ POLLENPLUS®



PARTICULARITĂȚILE AGRONOMICE:

- KWS Emphor este un soi multifuncțional și poate fi utilizat în panificație, zootehnie, uz energetic/biogaz și bioetanol.
- Un hibrid de generație nouă foarte productiv, cu un profil robust împotriva bolilor.
- Toleranță foarte ridicată la rugină brună.
- Toleranță excelentă la secetă.



KWS EMPHOR

Tip varietate:	Hibrid 100% F1
Uz/produs final	- boabe (panificație, furajare) - uz energetic/biomasă

RECOMANDĂRI:

Norma semănat, b.g./m2	- Sept. – 200 - 220 b.g./m2 - Oct. - 250 b.g./m2
Adâncime semănat:	2 - 3 cm
1U, Unitate sămânță:	- 1 mln.boabe/sac sau 25 mln. boabe sac/BB*



CARACTERISTICI:

- Însilozare la maturitate: - 30-40% SU*
- Umiditate la recoltare, boabe: - 13-15 %
- Producții boabe: - peste 10 to/ha
- Conținut proteine, % - 9-10%
- Rezistență frângere/cădere: - foarte bună
- Înălțime plante: - 128 - 130 cm
- Rezistență rugina brună/făinare/ergot: - foarte bună

* BB - big bag

* SU - substanță uscată

Micii eroi din fiecare fermă. Vise mari pentru viitor.



Fiind o companie de familie cu peste 165 de ani de experiență ca specialist în semințe știm ce înseamnă să lucrezi cu succes de-a lungul generațiilor. KWS susține fermierii să se pregătească pentru viitor - și să asigure o bună tranziție către generațiile următoare.

#ThinkingInGenerations

www.kws.com

**SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856**



Fit4NEXT - Culturile de acoperire KWS

KWS Fit4NEXT reprezintă soluția unică a companiei KWS pentru o agricultură durabilă și sustenabilă aliniată perfect noilor politici agrare comunitare (PNS 2023 – 2027) și ghidului bunelor practici agricole (GAEC).


Speciile din amestec și raportul dintre acestea au fost atent selecționate și determinate de KWS după mulți ani de experiențe și comercializare în areale foarte diferite, făcând posibilă integrarea speciilor potrivite în ceea ce privește aspectele fitosanitare și culturale (moment de înființare, dimensiunile biomasei, dimensiunile rădăcinilor, perioada de înflorire, comportamentul la îngheț). Astfel, a fost posibil să se dezvolte compozițiile ideale de amestecuri ce pot fi intercalate în rotația culturilor (muștar, ridichie, napi, lupin, in, hrișcă, phacelia, floarea soarelui).

Obiectivul principal este acela de a acoperi cât mai repede terenul, de a se dezvolta puternic astfel încât să suprimă apariția buruienilor.

Care sunt beneficiile utilizării unor astfel de amestecuri?

- Pot fi integrate ușor în orice asolament (rotația culturilor)
- Diversifică culturile aflate în rotație
- Suprimă dezvoltarea buruienilor
- Pierderile de apă prin evaporare sunt mult reduse
- Sporesc masa de rădăcini, fixând mai bine solul și implicit a elementelor minerale (în special a azotului – ușor levigabil)
- Îmbunătățește semnificativ activitatea microbiană și a microfaunei utile din sol
- Ajută în combaterea dăunătorilor de sol conform principiilor managementului integrat al dăunătorilor
- Contribuie la îmbunătățirea cantității de humus
- Creează biodiversitate
- Sechestrează cantități importante de CO₂
- Respectă cerințele de sustenabilitate și ecologizare

Diferite specii care îmbunătățesc dezvoltarea rădăcinilor și absorbția nutrienților



Ridiche


In

Camelina

Lupin

Floarea-soarelui

Reprezentare schematică a dezvoltării rădăcinilor în sol și a absorbției nutrienților, ilustrație proprie bazată pe Kutschera et. al., 2009 (KWS LOCHOW, 2023)



KWS Fit4NEXT

N-FIX PENTRU CULTURA RAPIȚEI

Amestec de culturi



Bine de știut

Leguminoase conținut în %: 25

Norma de semănat recomandată:

kg/ha: 12 - 17

Semințe/m²: 320 – 460

Data semănatului:

Iulie	August	Septembrie	Octombrie
■	■	■	■

■ Optim ■ Potrivit ■ Posibil

(KWS LOCHOW, 2022)

Avantaje:

- Amestec non-crucifer ideal ca premergătoare pentru cultura de rapiță
- Preluarea și fixarea azotului atmosferic cu ajutorul speciilor de leguminoase
- Buna înrădăcinare datorită diferitelor sisteme radiculare
- Posibila fertilizare organică încă din toamnă*
- Solubilizarea fosforului datorită prezentei Phacelia într-un procent semnificativ

*Conform prevederilor legale în vigoare



KWS Fit4NEXT

DIVERSITATE

Amestec de culturi

Avantaje:

- Un număr mare de specii melifere
- Buna înrădăcinare datorită diferitelor sisteme radiculare
- Diferite specii care ajută la preluarea elementelor minerale din sol, în special a fosforului
- Susține biodiversitatea și activitatea micro organismelor din sol

■ Optim ■ Potrivit ■ Posibil

Bine de știut

Leguminoase conținut în %: 29

Norma de semănat recomandată:

kg/ha: 18 - 27

Semințe/m²: 230 – 330

Data semănatului în primăvară:

Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
■	■	■	■

Data semănatului în vară:

Iulie	August	Septembrie	Octombrie
■	■	■	■

KWS Fit4NEXT

BIO MASA

Amestec de culturi



Bine de știut

Leguminoase conținut în %: 0

Norma de semănat recomandată:

kg/ha: 21 - 28

Semințe/m²: 180 - 260

Data semănatului:

Iulie	August	Septembrie	Octombrie
■	■	■	■

■ Optim ■ Potrivit ■ Posibil

(KWS LOCHOW, 2022)

Avantaje:

- Conținut ridicat de nutrienți datorită bio masei bogate
- Reduce levigarea nutrienților în apele subterane
- Dezvoltare rapidă → suprimă dezvoltarea buruienilor
- Potrivit pentru însămânțări târzii

*Conform prevederilor legale în vigoare.



KWS Fit4NEXT

N-MAX PENTRU CULTURA RAPIȚEI

Amestec de culturi

Avantaje:

- Conținut ridicat de leguminoase pentru a maximiza fixarea azotului atmosferic
- Amestec non-crucifer ideal ca premergătoare pentru cultura de rapiță
- Bună înrădăcinare datorită diferitelor sisteme radiculare
- Pretabil în orice tip de asolament

■ Optim ■ Potrivit ■ Posibil

(KWS LOCHOW, 2022)

Bine de știut

Leguminoase conținut în %: 62

Norma de semănat recomandată:

kg/ha: 21 - 29

Semințe/m²: 330 - 480

Data semănatului:

Iulie	August	Septembrie	Octombrie
■	■	■	■

Faceți cunoștință cu KWS MAIA

Propriul tău asistent de buzunar!

Aducându-vă o combinație unică de expertiză
agroeconomică și cunoștințele KWS

#KWS MAIA #Asistentagricol

Compania KWS urmează toate tendințele agriculturii moderne, toate acestea cu scopul de a oferi, pe lângă produse de calitate, servicii adecvate producătorilor. Una dintre noutăți este chat-ul AI care vă va permite să obțineți toate informațiile - verificate și corecte - în orice moment - oriunde - 24/7

Cine este KWS MAIA?

Expertiză:

- Cunoștințe de specialitate în știința solului, managementul culturilor și în domeniul practicilor agricole durabile
- Expert certificat în semințe KWS

Experiență:

- Experiență vastă în consultanță agricolă
- Cunoașterea aprofundată a portofoliului de produse KWS
- Expertiză în vânzări, cu un istoric demonstrat de dezvoltare a unor relații pozitive și de durată



Cu un pas înainte

KWS MAIA

Eu sunt MAIA.

KWS MAIA

KWS MAIA este o soluție simplă de utilizat, disponibilă pe toate dispozitivele mobile prin intermediul WhatsApp! Platforma de consiliere digitală vine în sprijinul fermierilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Utilizând KWS MAIA, fermierii beneficiază de un consilier de încredere personalizat, care le oferă răspunsuri imediate în orice moment!


Beneficii pentru fermieri

- Comoditate oricând și oriunde
- Recomandări personalizate
- O mai bună planificare a culturilor și optimizare a producției
- Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor

Cum se utilizează?

Sunt necesari doar doi pași pentru a începe!

- Mergeți la WhatsApp
- Adăugați numărul de telefon 0732 120 821
- Conectați-vă!



1

2



Puteți să mă întrebați orice
despre compania KWS

Dacă vă plac răspunsurile mele,
vă voi putea ajuta cu mai multe
sfaturi practice în curând!

KWS MAIA

Propriul tău asistent de buzunar!

Combinatia unică de
expertiză agroeconomică și
cunoștințele KWS.

24/7



SEMĂNĂM
VIITORUL
DIN 1856



myKWS - CONSULTANȚĂ DIGITALĂ PENTRU FERMIERI

myKWS este aplicația care vă ajută să luați cele mai bune decizii prin intermediul tehnologiei, respectiv platforma noastră digitală care ne ajută să rămânem conectați și locul unde găsiți soluții utile pe baza informațiilor personalizate furnizate de instrumentele noastre digitale. Vrem să fim alături de dumneavoastră pe durata întregului an, cu cele mai folositoare sfaturi și recomandări, oferindu-vă astfel instrumentele și informațiile necesare pentru culturile din ferma dumneavoastră.



my
KWS

Începeți ziua cu informații utile

Aici veți găsi prognoza meteo actualizată, informații, recomandări precum și diferite notificări. Puteți obține o vedere de ansamblu utilizând informațiile consultanților regionali, pentru a vă optimiza gestionarea activității din fermă. Consilierul dumneavoastră KWS vă însoțește pe tot parcursul anului, chiar dacă nu este la față locului.




Prognoza Meteo

Una dintre opțiunile disponibile în aplicația myKWS este Prognoza Meteo. Cu serviciul nostru meteo, aveți întotdeauna la îndemână toți parametrii importanți pentru agricultură.

Avantajele datelor aplicației meteo:


- Date meteo la zi;
- Date meteo pentru următoarele 7 zile;
- Precipitații;
- Punct de rouă;
- Viteza vântului;
- Gradul de umiditate.



Verificarea vitalității culturilor

Instrumentul pentru monitorizarea stării de sănătate a culturilor pe întreaga perioadă de vegetație. Este disponibil pentru toate culturile.

Hărțile generate pentru verificarea vitalității culturilor dumneavoastră sunt imagini scanate tip NDVI, o abreviere pentru „Indicele de vegetație cu diferențe normalizate”. Identificarea zonelor afectate de eroziune, secetă, diferențe de sol sau alte probleme în vegetație. Actualizare săptămânală pe baza imaginilor culese de satelitul Sentinel-2.



Consultantul culturilor

Acest instrument vă permite să realizați testarea digitală a diferitelor variante de asolament.

Evaluările economice și agronomice vă ajută în planificarea rotațiilor adecvate pentru parcelele dumneavoastră.



INSTRUMENTE	DESCRIERE	TIP DE CULTURĂ	DISPONIBILITATE
	Verificarea vitalității culturii Aruncați o privire asupra hărților de biomasă pentru a estima gradul de vitalitate a culturii.		PE ÎNTREG SEZONUL
	Digital4CAST Optimizarea performanței terenurilor cu ajutorul dronelor și a tehnologiilor moderne. Marcați-vă câmpurile și urmați pașii următori.		LA CERERE
	Calculatorul necesarului de sămânță Calculați densitatea la semănat dorită și cantitatea de semințe necesare.		PE ÎNTREG SEZONUL
	Semănatul cu normă variabilă Este un instrument digital care oferă informații despre performanța terenului, precum și recomandări privind densitatea optimă de semănat în funcție de potențialul solului.		LA CERERE
	Temperatura solului Este un instrument digital cu ajutorul căruia puteți verifica ultimele evaluări ale temperaturii măsurate a solului pentru locația stabilită. Se pot obține astfel recomandări privind data optimă de semănat.		PE ÎNTREG SEZONUL
	Radarul parcelelor Instrument utilizat pentru marcarea locațiilor importante pentru fermier în interiorul parcelei. Folosește geolocația telefonului mobil, marcând cu precizie locul cu probleme (dăunători, boli, goluri în cultură, bălțiri, etc.). Fermierul poate adăuga notițe/comentarii sau poze, putând, astfel să urmărească evoluția evenimentului marcat.		PE ÎNTREG SEZONUL

Vrei să vezi ce producții au fost și în alte regiuni?



my
KWS

Aplicația este disponibilă atât pe desktop, cât și pe telefon, unde puteți primi simplu și rapid cele mai importante știri și informații cu ajutorul cărora vă puteți optimiza activitatea din fermă.

La fel ca alți fermieri din Europa, și dumneavoastră puteți beneficia de serviciile digitale KWS. Noua aplicație myKWS oferă cele mai importante instrumente și servicii pentru activitatea din fermă de zi cu zi, cu acces ușor chiar și pentru telefonul mobil. Aplicația myKWS este un concept de servicii complete care oferă clienților informații utile pentru o monitorizare eficientă a culturilor.

Descărcați gratuit aplicația myKWS.
Scanați codul de bare pentru mai multe informații.



Echipa de vânzări KWS Semințe

REGIUNEA 1

Omet Daniel

Director Regional zona 1
0730 713 891
daniel.omet@kws.com

Claudia Gimiga

Sales Representative CL
0737 551 200
florinela-cla.gimiga@kws.com

Marian Novac

Sales Representative CT
0725 999 745
marian.novac@kws.com

Sorin Baban

Sales Representative TL
0738 762 942
sorin.baban@kws.com

REGIUNEA 2

Ioan Cioc

Director Regional zona 2
0723 333 224
ioan.cioc@kws.com

Victor Păunescu

Sales Representative OT
0730 715 808
victor.paunescu@kws.com

Mihai Marin

Sales Representative GJ, MH
0730 713 887
mihai.marin@kws.com

Cosmin Bunăiașu

Sales Representative DJ, VL
0731 492 237
cosmin.bunaiasu@kws.com

REGIUNEA 3

Alda Onișor

Director Regional zona 3
0731 792 350
onișor.alda@kws.com

Claudiu Moise

Sales Representative TM SUD, CS
0731 345 241
claudiu.moise@kws.com

Mariana Samoilă

Sales Representative TM NORD, CS
0731 494 869
mariana.samoila@kws.com

Lucian Popa

Sales Representative AR
0753 020 735
lucian-ramses.popa@kws.com

Ovidiu Chevereșan

Sales Representative AR
0733 103 899
ovidiu.cheveresan@kws.com

REGIUNEA 4

Ionuț Tamba

Director Regional zona 4
0725 999 746
ionut.tamba@kws.com

Zoltán Szénási

Sales Representative MM, SM, SJ
0729 019 150
zoltan.szenasi@kws.com

Diana Maria Purice

Sales Representative BH SUD
0738 843 873
diana.purice@kws.com

Attila Miklos

Sales Representative BH
NORD, SJ
0729 218 968
attila.miklos@kws.com

REGIUNEA 5

Jozsef Sepsi

Director Regional zona 5
0726 555 606
jozsef.sepsi@kws.com

Ilie Bădiță

Sales Representative
AB, HD și SB
0728 977 915
ilie.badita@kws.com

Attila Téglás

Sales Representative CJ, BN
0728 855 389
attila.teglas@kws.com

Radu Bercu

Sales Representative MS
0724 544 269
radu.bercu@kws.com

Florin Mureșan

Sales Representative BV, CV,
HG, MS
0732 164 321
florin.muresan@kws.com

REGIUNEA 6

Costel Ungureanu

Director Regional zona 6
0724 588 906
costel.ungureanu@kws.com

Alexandra Ghiurțu

Sales Representative NT
0731 791 195
alexandra.ghiurtu@kws.com

Rareș Sumănariu

Sales Representative IS
0728 859 009
rareș.sumanariu@kws.com

Lucian Epure

Sales Representative BT
0731 510 757
lucian.epure@kws.com

Ioana Sabina Băițatu

Sales Representative SV
0726 366 495
sabina-ioana.lefter@kws.com

REGIUNEA 7

Ciprian Sava

Director Regional zona 7
0731 510 755
ciprian.sava@kws.com

Iulian Neculiță

Sales Representative GL
0731 345 239
iulian.neculita@kws.com

Alexandra Mihaela Șorea

Sales Representative BC
0730 713 776
alexandra.sorea@kws.com

Mușat Alin Florin

Sales Representative VS
0724 588 907
alin-florin.musat@kws.com

Adrian Hodină

Sales Representative VN
0735 315 104
adrian.hodina@kws.com

REGIUNEA 8

Bogdan Huștiu

Director Regional zona 8
0742 955 479
bogdan.hustiu@kws.com

Ionuț Andrei Anghel

Sales Representative PH
0727 811 412
ionut.anghel@kws.com

Ion Marinescu

Sales Representative BR
0728 996 133
ion.marinescu@kws.com

Bogdan-Petru Blană

Sales Representative BR
0799 000 018
blana.bogdan-petru@kws.com

Diana Oancea

Sales Representative BZ
0730 713 429
diana.oancea@kws.com

REGIUNEA 9

Alex Răducanu

Director Regional zona 9
0731 493 823
alex.raducanu@kws.com

Corina-Ica Stanciu

Sales Representative AG
0737 553 262
corina-ica.stanciu@kws.com

Florin Stoica

Sales Representative DB, IF
0730 713 892
florin.stoica@kws.com

Alin Ghinea

Sales Representative GR
0731 345 240
alin-constant.ghinea@kws.com

Iliuță Peța

Sales Representative TR
0722 624 032
iliuta.petza@kws.com


Sorin Gliga

Sales Representative IL
0731 491 632
sorin.gliga@kws.com

Cătălin Enache

Sales Representative IL
0738 762 227
catalin.enache@kws.com

Suntem doar la un apel distanță!



Cristian Deliu

Director Comercial Vest
R2, R3, R4, R5
0742 258 879
cristian.deliu@kws.com

Viorel Drăgușin

Director comercial Est
R1, R6, R7, R8, R9
0746 230 344
viorel.dragusin@kws.com

Roxana Gaman

Key Account Manager
0722 160 852
roxana.gaman@kws.com

Adrian Frigea

Key Account Manager
0726 707 995
adrian.friga@kws.com

Dan Morgovan

Key Account Manager
Clienți Strategici
0724 202 766
dan.morgovan@kws.com

KWS ROMÂNIA

Urmăriți-ne pe:





KWS SEMINTE S.R.L.

Str. Barajul Argeş, nr. 6

Sector 1, Bucureşti Cod Poştal 014121

Tel: +40 21 315 42 80

Fax: +40 21 310 42 38

E-mail: office@kws.ro

www.kws.ro